化学计量在实验中的 应用（一）

- 1.知道摩尔(mol)、阿伏加德罗常数、摩尔质量、气体摩尔体积的含义。
- 2.能根据物质的量与微粒(原子、分子、离子等)数目、物质的质量、气体体积(标准状况)之间的相互关系进行有关计算。
- 3.能正确解答阿伏加德罗常数及阿伏加德罗定律与物质的组成、结构及重要反应综合应用题。

考点一 物质的量、摩尔质量

1. 物质的量

(1) 物质的量(n)

物质的量是表示含有一定数目粒子的集合体的物理量，单位为摩尔(mol)。

(2) 物质的量的规范表示方法：

(3)阿伏加德罗常数(N_A)

0.012 kg ^{12}C 所含原子数为阿伏加德罗常数，其数值约为 6.02×10^{23} ，单位为 mol^{-1} 。

公式：
$$N_A = \frac{N}{n}$$

2. 摩尔质量

- (1) 摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量。单位是 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。公式：
$$M = \frac{m}{n}$$
- (2) 数值：以 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 为单位时，任何粒子的摩尔质量在数值上都等于该粒子的相对分子(原子)质量。

深度思考

1. 1 mol NaCl和1 mol HCl所含的粒子数相同吗？

2. 阿伏加德罗常数(N_A)与 6.02×10^{23} 完全相同吗？

题组一 有关概念的理解

1. 下列说法中正确的是 ()
- A. 1 mol任何物质都含有 6.02×10^{23} 个分子
 - B. 1 mol Ne中含有约 6.02×10^{24} 个电子
 - C. 1 mol水中含2 mol氢和1 mol氧
 - D. 摩尔是化学上常用的一个物理量

摩尔质量与相对原子(分子)质量的易混点

(1)相对原子(分子)质量与摩尔质量(以g为单位时)不是同一个物理量，单位不同，只是在数值上相等。

(2)摩尔质量的单位为 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，相对原子(分子)质量的单位为1。

易错警示

题组二 有关分子(或特定组合)中的微粒数计算

2. 标准状况下有：①0.112 L水 ② 3.01×10^{23} 个HCl分子
子 ③13.6 g H_2S 气体 ④0.2 mol氨气 ⑤2 mol氦气 ⑥
 6.02×10^{23} 个白磷分子，所含原子个数从大到小的顺序为

_____。

题组三 物质的质量与微粒数目之间的换算

3. 最近材料科学研究发现了首例带结晶水的晶体在5 K下呈现超导性。据报道，该晶体的化学式为 $\text{Na}_{0.35} \text{CoO}_2 \cdot 1.3\text{H}_2\text{O}$ 。若用 N_A 表示阿伏加德罗常数，试计算12.2 g该晶体中含氧原子数_____，氢原子的物质的量_____mol。

有关微粒数目比较的思维方法

考点二 气体摩尔体积、阿伏加德罗定律

1. 影响物质体积大小的因素

(1)构成物质的微粒的大小(物质的本性)。

(2)构成物质的微粒之间距离的大小(由温度与压强共同决定)。

(3)构成物质的微粒的多少(物质的量的大小)。

2. 气体摩尔体积

(1)含义：单位物质的量的气体所占的体积，符号 V_m ，

标准状况下， $V_m = \underline{22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}}$ 。

(2) 相关计算

①基本表达式：
$$V_m = \frac{V}{n}$$

②与气体质量的关系：
$$\frac{m}{M} = \frac{V}{V_m}$$

③与气体分子数的关系：
$$\frac{V}{V_m} = \frac{N}{N_A}$$

(3)影响因素：气体摩尔体积的数值不是固定不变的，它决定于气体所处的温度和压强。

3. 阿伏加德罗定律及其推论应用

(1)阿伏加德罗定律：同温同压下，相同**体积**的任何气体，含有**相同**数目的分子(或气体的物质的量相同)。

(2)阿伏加德罗定律的推论(可通过 $pV=nRT$ 及

$$n = \frac{m}{M}, \rho = \frac{m}{V} \text{ 导出})$$

相同条件	结论	
	公式	语言叙述
$T、p$ 相同	$\frac{n_1}{n_2} = \frac{V_1}{V_2}$	同温、同压下, 气体的体积与其物质的量成正比
$T、V$ 相同	$\frac{p_1}{p_2} = \frac{n_1}{n_2}$	温度、体积相同的气体, 其压强与其物质的量成正比
$T、p$ 相同	$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{M_1}{M_2}$	同温、同压下, 气体的密度与其摩尔质量(或相对分子质量)成正比

特别提醒

(1)阿伏加德罗定律的适用范围是气体，其适用条件是三个“同”，即在同温、同压、同体积的条件下，才有分子数相等这一结论，但所含原子数不一定相等。

(2)阿伏加德罗定律既适用于单一气体，也适用于混合气体。

深度思考

1. 标准状况下，1 mol气体的体积是22.4 L，如果当1 mol气体的体积是22.4 L时，一定是标准状况吗？
2. 由阿伏加德罗常数(N_A)和一个水分子的质量($m_{\text{水}}$)、一个水分子的体积($V_{\text{水}}$)不能确定的物理量是_____。

题组一 以“物质的量”为中心的计算

1. 设 N_A 为阿伏加德罗常数，如果 $a\text{ g}$ 某气态双原子分子的分子数为 p ，则 $b\text{ g}$ 该气体在标准状况下的体积 $V(\text{L})$ 是 ()

A. $\frac{22.4ap}{bN_A}$

B. $\frac{22.4ab}{pN_A}$

C. $\frac{22.4N_A b}{a}$

D. $\frac{22.4pb}{aN_A}$

反思归纳

熟记宏观物理量与微观粒子数转化关系

物质的量通过摩尔质量、气体摩尔体积、阿伏加德罗常数将宏观物理量物质的质量、气体的体积与微观物理量微粒个数、微粒的质量联系起来。

题组二 阿伏加德罗定律及推论的应用

2. 下列两种气体的分子数一定相等的是 ()
- A. 质量相等、密度不同的 N_2 和 C_2H_4
 - B. 体积相等的 CO 和 N_2
 - C. 等温、等体积的 O_2 和 N_2
 - D. 等压、等体积的 N_2 和 CH_4

求气体的摩尔质量*M*的常用方法

(1)根据标准状况下气体的密度 ρ : $M=\rho \times 22.4(\text{g mol}^{-1})$;

(2)根据气体的相对密度 ($D = \frac{\rho_1}{\rho_2}$): $\frac{M_1}{M_2} = D$;

(3)根据物质的质量(m)和物质的量(n): $M = \frac{m}{n}$;

(4)根据一定质量(m)的物质中微粒数目(N)和阿伏加德罗常数 (N_A): $M = N_A \cdot \frac{m}{N}$;

反思归纳

求气体的摩尔质量 M 的常用方法

(5)对于混合气体, 求其平均摩尔质量, 上述计算式仍然成立; 还可以用下式计算: $\bar{M} = \bar{M}_1 \times a\% + \bar{M}_2 \times b\% + \bar{M}_3 \times c\% \dots\dots$, $a\%$ 、 $b\%$ 、 $c\%$ 指混合物中各成分的物质的量分数(或体积分数)。

反思归纳

考点三 突破阿伏加德罗常数应用的 六个陷阱

题组一 气体摩尔体积的适用条件及物质的聚集状态

1. (全国卷, 9D)判断正误, 正确的划“√”, 错误的划“×”
- (1) 2.24 L CO_2 中含有的原子数为 $0.3N_A$ ()
 - (2) 常温下11.2 L甲烷气体含有的甲烷分子数为 $0.5N_A$ ()
 - (3) 标准状况下, 22.4 L己烷中含共价键数目为 $19N_A$ ()
 - (4) 常温常压下, 22.4 L氯气与足量镁粉充分反应, 转移的电子数为 $2N_A$ ()

题组二 物质的量或质量与状况

2. (全国卷, 9C)判断正误, 正确的划“√”, 错误的划“×”

(1)常温常压下, 3.2 g O_2 所含的原子数为 $0.2N_A$ ()

(2)标准状况下, 18 g H_2O 所含的氧原子数目为 N_A ()

(3)常温常压下, 92 g NO_2 和 N_2O_4 的混合气体中含有的原子总数为 $6N_A$ ()

题组三 物质的微观结构

3. 判断正误，正确的划“√”，错误的划“×”

(1) 4.5 g SiO_2 晶体中含有的硅氧键的数目为 $0.3N_A$ ()

(2) 30 g 甲醛中含共用电子对总数为 $4N_A$ ()

(3) 标准状况下，22.4 L 氦气与22.4 L 氟气所含原子数均为 $2N_A$ ()

(4) 18 g D_2O 所含的电子数为 $10N_A$ ()

(5) 1 mol Na_2O_2 固体中含离子总数为 $4N_A$

()

(6) 12 g 金刚石中含有的共价键数为 $2N_A$

()

(7) 12 g 石墨中含有的共价键数为 $1.5N_A$

()

(8) 31 g 白磷中含有的共价键数为 $1.5N_A$

()

1. 只给出物质的体积，而不指明物质的状态，或者标准状况下物质的状态不为气体，所以求解时，一要看是否为标准状况下，不为标准状况无法直接用 22.4 L mol^{-1} (标准状况下气体的摩尔体积)求 n ；二要看物质在标准状况下是否为气态，若不为气态也无法由标准状况下气体的摩尔体积求得 n ，如 CCl_4 、水、液溴、 SO_3 、己烷、苯等常作为命题的干扰因素迷惑学生。

2. 给出非标准状况下气体的物质的量或质量，干扰学生正确判断，误以为无法求解物质所含的粒子数，实质上，此时物质所含的粒子数与温度、压强等外界条件无关。

3. 此类题型要求同学们对物质的微观构成要非常熟悉，弄清楚微粒中相关粒子数(质子数、中子数、电子数)及离子数、电荷数、化学键之间的关系。常涉及稀有气体He、Ne等单原子分子， Cl_2 、 N_2 、 O_2 、 H_2 等双原子分子，及 O_3 、 P_4 、 $^{18}\text{O}_2$ 、 D_2O 、 Na_2O_2 、 CH_4 、 CO_2 等特殊物质。

题组四 电解质溶液中，粒子数目的判断

4. 判断正误，正确的划“√”，错误的划“×”

(1) $0.1\text{ L } 3.0\text{ mol L}^{-1}$ 的 NH_4NO_3 溶液中含有的 NH 的数目为 $0.3 N_A$ ()

(2) 等体积、等物质的量浓度的 NaCl ， KCl 溶液中，阴、阳离子数目之和均为 $2N_A$ ()

(3) 0.1 mol L^{-1} 的 NaHSO_4 溶液中，阳离子的数目之和为 $0.2N_A$ ()

(4) $25\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $\text{pH}=13$ 的 1.0 L Ba(OH)_2 溶液中含有的 OH^- 数目为 $0.2N_A$ ()

题组五 阿伏加德罗常数的应用与“隐含反应”

5. 判断正误，正确的划“√”，错误的划“×”

(1) 2 mol SO_2 和1 mol O_2 在一定条件下充分反应后，混合物的分子数为 $2N_A$ ()

(2) 标准状况下，22.4 L NO_2 气体中所含分子数目为 N_A ()

(3) 100 g 17%的氨水，溶液中含有的 NH_3 分子数为 N_A ()

(4) 标准状况下，0.1 mol Cl_2 溶于水，转移的电子数目为 $0.1N_A$ ()

题组六 氧化还原反应中电子转移数目的判断

6. 判断正误，正确的划“√”，错误的划“×”

(1) 5.6 g 铁粉与硝酸反应失去的电子数一定为 $0.3N_A$ ()

(2) 0.1 mol Zn 与含 0.1 mol HCl 的盐酸充分反应，转移的电子数目为 $0.2N_A$ ()

(3) 1 mol Na 与足量 O_2 反应，生成 Na_2O 和 Na_2O_2 的混合物，转移的电子数为 N_A ()

(4) $1 \text{ mol Na}_2\text{O}_2$ 与足量 CO_2 充分反应转移的电子数为 $2N_A$ ()

(5) 向 FeI_2 溶液中通入适量 Cl_2 ，当有 1 mol Fe^{2+} 被氧化时，共转移的电子的数目为 N_A ()

(6) 1 mol Cl_2 参加反应转移电子数一定为 $2N_A$ ()

4. 突破此类题目的陷阱，关键在于审题：

(1) 是否有弱离子的水解。

(2) 是否指明了溶液的体积。

(3) 所给条件是否与电解质的组成有关，如pH=1的 H_2SO_4 溶液 $c(\text{H}^+) = 0.1 \text{ mol L}^{-1}$ ，与电解质的组成无关； 0.05 mol L^{-1} 的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液， $c(\text{OH}^-) = 0.1 \text{ mol L}^{-1}$ ，与电解质的组成有关。

5. 解决此类题目的关键是注意一些“隐含反应”，如：

6. 氧化还原反应中转移电子数目的

判断是一类典型的“陷阱”，突破“陷阱”的关键是：

(1)同一种物质在不同反应中氧化剂、还原剂的判断。

如① Cl_2 和Fe、Cu等反应， Cl_2 只做氧化剂，而 Cl_2 和NaOH反应， Cl_2 既做氧化剂，又做还原剂。

② Na_2O_2 与 CO_2 或 H_2O 反应， Na_2O_2 既做氧化剂，又做还原剂，而 Na_2O_2 与 SO_2 反应， Na_2O_2 只做氧化剂。

(2)量不同，所表现的化合价不同。

如Fe和HNO₃反应，Fe不足，生成Fe³⁺，Fe过量，生成Fe²⁺。

(3)氧化剂或还原剂不同，所表现的化合价不同。

如Cu和Cl₂反应生成CuCl₂，而Cu和S反应生成Cu₂S。

(4)注意氧化还原的顺序。

如向FeI₂溶液中，通入Cl₂，首先氧化I⁻，再氧化Fe²⁺，所以上述题(5)中转移的电子数目大于N_A。

黄冈学习网
www.hgxxw.net